

Полтавський державний медичний університет
Кафедра терапевтичної стоматології

Індекс ICDAS у МОЛОДИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

К.МЕД.Н., ДОЦ. ІЛЕНКО-ЛОБАЧ Н.В.,

СТУДЕНКА 3 ГРУПИ 5 КУРСУ СТОМАТОЛОГІНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕХ Ю.С.,

К.МЕД.Н., ДОЦ. ІЛЕНКО Н.М.

Актуальність теми

Тривале військове протистояння та активна фаза бойових дій, яка триває в Україні більше року, безповоротно змінили життя населення



By Reuters

Актуальність теми

Гострий і хронічний стрес, психічні захворювання, тривога, посттравматичний стресовий розлад – це лише частина психологічних станів, які супроводжують життя українців зараз. Ці екстремальні навантаження впливають на стан організму в цілому та окремих органів і систем зокрема



by Rodrigo Abd

Мета дослідження



Визначити стан твердих тканин зубів у молодих людей, які значно постраждали в період воєнного стану

by Emilio Morenatti for AP

Об'єкти дослідження


У дослідженні взяли участь 18 молодих людей віком 19-26 років, які є студентами Полтавського державного медичного університету. Вони прибули із зони активних бойових дій, регіонів, які окуповані ворогом або перевелися в ПДМУ після початку активної фази агресії з інших університетів на цих територіях.

Матеріали і методи

- ▶ Усім обстеженим визначено **індекс ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)**, який дозволяє визначити стадію та глибину каріозного процесу, починаючи з початкових некаріозних змін.
- ▶ Психологічний стан усіх досліджуваних оцінювали за **шкалою самооцінки тривожності (О.С. Чабан, О.А. Хаустова)** та **шкалою депресивності Бека**.

Результати дослідження

Каріозні ураження виявлені у всіх учасників, тому поширеність карієсу становить 100%. Індекс ICDAS для респондентів становив $4,28 \pm 0,93$.



Результати дослідження

У обстежених переважали ураження з **кодами 1** (перші візуальні зміни емалі, помітні лише після тривалого висихання) **та 2** (видимі зміни емалі зуба у вигляді білої або коричневої плями), що свідчить про високу активність процесів демінералізації та розвитку карієсу у осіб, які перебувають під впливом сильних стресових факторів.

Результати дослідження

Ознаки депресії виявлені у 44,4% обстежених. Вищий за середній рівень тривожності мали 33,3% респондентів, середній – 16,7% і лише 50% – рівень тривожності в межах нормотипового показника .



Висновки

Поширеність та активність каріозних уражень, що відображає індекс ICDAS у молодих людей, які значно постраждали в період воєнного стану, є високими на фоні фізіологічних змін.



by Emilio Morenatti for AP