

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

**СТАН СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я У
ТЮТЮНОЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ**

Петрушанко Т. О., Петрушанко В.М.

КУРІННЯ

Вдихання диму речовин, переважно рослинного походження (тютюн, гашиш, маріхуана, опіум, крек...), що тліють у потоках повітря, що вдихається

Мета - насичення організму активними речовинами, що містяться в них, шляхом їх сублімації і подальшого всмоктування в легенях і дихальних шляхах

КУРІННЯ

Вид побутової наркоманії, найпоширеніша форма якої –
нікотинізм

36 % населення 18-65 років України – курці
(у Європейському Союзі – 28,6 %)

Чоловіків, які щоденно палять, - **80 %** серед усіх курців

Всього в Україні курять понад **58 %** чоловіків та **17 %** жінок
(у Європейському регіоні ВООЗ – **40 %** чоловіків та **18,2 %** жінок)

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінити стан стоматологічного здоров'я
пацієнтів із нікотинізмом

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

39 осіб 20-55 років, що страждають на нікотинізм та
мають стаж паління понад 5 років
(дослідна група)

20 осіб аналогічного віку без шкідливої звички паління
(контрольна група)

Проведено клінічне та рентгенологічне обстеження

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

Ураженість слизової рота, в тому числі і слизової альвеолярних паростків – у 100% осіб дослідної групи (у контрольній групі - 5% захворювання слизової рота, 78% хвороби тканин пародонта)

Поширеність каріозного процесу – у 100% осіб дослідної та контрольної груп

Інтенсивність (індекс КПВ) – прямо залежить від віку та стажу паління, достовірно вища в осіб дослідної групи

ЗМІНИ У ПОРОЖНИНІ РОТА КУРЦІВ

- Ксеростомія
- Порушення смакових відчуттів
- Фонові та передракові ураження слизової рота
- Нікотиновий стоматит



ЗМІНИ У ПОРОЖНИНІ РОТА КУРЦІВ



ЗМІНИ У ПОРОЖНИНІ РОТА КУРЦІВ

- Назубні відкладення немінералізовані та мінералізовані
- Запально-дистрофічні зміни пародонта без скарг на кровоточивість ясен



Фото порожнини рота пацієнтки С., 29 років (стаж куріння – 9 р.)

ЗМІНИ У ПОРОЖНИНІ РОТА КУРЦІВ

- Назубні відкладення немінералізовані та мінералізовані
- Запально-дистрофічні зміни пародонта без скарг на кровоточивість ясен



Фото порожнини рота пацієнта К., 48 років (стаж куріння – 29 р.)

ЗМІНИ У ПОРОЖНИНІ РОТА КУРЦІВ



Фото та ОПТГ пацієнтки П., 30 р. (стаж паління – 6 років)



ОПТГ пацієнтки Г., 26 років (стаж куріння — 8 р.)



ОПТГ пацієнта В., 54 роки (стаж куріння – 40 р.)




Фото порожнини рота пацієнтки С., 34 р. (стаж куріння – 10 р.)

ВИСНОВКИ

1. Поширеність каріозних уражень зубів у тютюнозалежних пацієнтів складає 100%, інтенсивність достовірно вища, ніж в осіб контрольної групи та збільшується із віком та тривалістю куріння
2. Ураженість слизової рота та тканин пародонта виявлена у 100 % осіб із нікотинізмом
3. У структурі хвороб слизової рота превалюють хронічний катаральний стоматит, лейкоплакія, ксеростомія

ВИСНОВКИ

4. У тютюнозалежних осіб ураженість пародонта виявлена у 100%, тоді як в осіб контрольної групи – в 78%. Курці рідко скаржаться на кровоточивість ясен, больові відчуття в яснах. Ураження пародонта осіб із нікотинізмом проявляються у вигляді генералізованого хронічного запально-дистрофічного процесу
5. Стан гігієни порожнини рота тютюнозалежних осіб незадовільний на відміну від задовільного осіб контрольної групи
6. Планування лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги курцям повинно першочергово базуватись на лікуванні нікотинізму