

Полтавський державний медичний університет

**МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
З АДЕНТІЄЮ ЛАТЕРАЛЬНИХ РІЗЦІВ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)**

Виженко Є.Є., Добровольський О.В., Добровольська О.В.

Актуальність Серед аномалій розвитку зубів адентія посідає одне із провідних місць. У дітей, які звертаються за ортодонтичною допомогою, така аномалія зустрічається до 22 % випадків.

Основним методом лікування адентії є протезування. В ряді випадків перед ортопедичною реабілітацією таких пацієнтів необхідна ортодонтична підготовка

Мета Оптимізація лікування пацієнтів з адентією латеральних різців .



На кафедру післядипломної освіти лікарів-ортодонтів Полтавського державного медичного університету звернулася пацієнтка Б., 15 років зі скаргами на естетичний недолік зубів на верхній щелепі.

Раніше лікувалася ортодонтично, звернулась на кафедру у зв'язку зі зміною місця проживання

Об'єктивно: зафіксована брекет-система на верхню щелепу.

Після основного та додаткових методів дослідження встановлено діагноз: І клас за Енглем, звуження зубних рядів верхньої та нижньої щелеп первинна адентія 12, 22, транспозиція 13 та 14, торт оклюзія 15, флюороз ІІ ступеню.

КПКТ



Внутрішньопотові фото



Метою лікування для пацієнтки було усунення дефектів зубного ряду верхньої щелепи та усунення естетичних недоліків кольору та форми зубів.

Тому на першому етапі було проведене ортодонтичне лікування для нормалізації форми зубного ряду верхньої щелепи та створення місця для 12, 22 зубів з наступним протезуванням незнімною естетичною ортопедичною конструкцією 10 зубів верхньої щелепи (15 - 25).

На першому етапі ортопедичної реабілітації пацієнтки виготовлена провізорна конструкція з композиту довгострокового носіння.

На другому етапі проведено протезування цирконієвими коронками.



Висновок. В результаті проведеного лікування вдалося досягти позитивного морфоестетичного та функціонального результату, яке повністю задовольнило пацієнтку.