

Показання до застосування та
вибір конструкції часткових
знімних пластинкових
протезів, матеріали для їх
виготовлення. Одержання
відбитків, визначення меж при
різній топографії дефектів
зубних рядів.

При огляді ротової порожнини пацієнта А., 65 р., виявлено, що альвеолярний відросток беззубої н/щ різко атрофований у фронтальному відділі і добре виражений у дистальному. Який це тип за класифікацією Келлера?

При огляді ротової порожнини пацієнта А., 65 р., виявлено, що альвеолярний відросток беззубої н/щ різко атрофований у фронтальному відділі і добре виражений у дистальному. Який це тип за класифікацією Келлера?

- **А *Четвертий**
- **В** Перший
- **С** Другий
- **Д** Третій
- **Е** -

При постановці діагнозу в клініці
ортопедичної стоматології
використовуються різні класифікації. Хто з
перерахованих нижче авторів запропонував
класифікацію беззубих нижні щелеп?

При постановці діагнозу в клініці ортопедичної стоматології використовуються різні класифікації. Хто з перерахованих нижче авторів запропонував класифікацію беззубих нижні щелеп?

- **A Келлер**
- **B Кеннеді**
- **C Гаврилов**
- **D Варес**
- **E Шредер**

У хворого А., 45 р., внаслідок несвоєчасного лікування виник несправжній суглоб в ділянці тіла н/щ справа. Зубна формула: 87654321S12345678000000000S000000678. Яку ортопедичну конструкцію необхідно виготовити хворому?

У хворого А., 45 р., внаслідок несвоєчасного лікування виник несправжній суглоб в ділянці тіла н/щ справа. Зубна формула: 87654321S1234567800000000S000000678. Яку ортопедичну конструкцію необхідно виготовити хворому?

- **А Знімний протез з шарніром**
- **В** Мостовидний протез
- **С** Частковий знімний пластинковий протез
- **Д** Повний знімний пластинковий протез
- **Е** Бюгельний протез