

Клінічний етап перевірки конструкції
часткового знімного пластинкового
протеза. Корекція та накладання
часткового знімного пластинкового
протеза, правила користування та
догляд за ним. Фази адаптації до
часткового знімного пластинкового
протеза, його функціональна
ефективність та терміни
користування.

На етапі перевірки повних знімних протезів виявлено прогнатичне співвідношення зубних рядів, передні зуби не контактують. Назвіть причину, яка призвела до даної помилки?

На етапі перевірки повних знімних протезів виявлено прогнатичне співвідношення зубних рядів, передні зуби не контактують. Назвіть причину, яка призвела до даної помилки?

- **A *Фіксація передньої оклюзії**
- **B** Зафіксована бокова оклюзія
- **C** Не визначена протетична площа.
- **D** Занижена міжальвеолярна висота
- **E** Неправильне формування протетичної площини.

Хворий Ф., 68 років, з повною втратою зубів на обох щелепах звернувся в ортопедичне відділення з метою протезування. Під час перевірки конструкцій протезів на восковому базисі виявили, що міжзубний контакт спостерігається тільки в бокових ділянках. У фронтальній ділянці – сагітальна щілина шириною 1 см. Яка помилка, на Ваш погляд, допущена під час попередніх клінічних етапів?

Хворий Ф., 68 років, з повною втратою зубів на обох щелепах звернувся в ортопедичне відділення з метою протезування. Під час перевірки конструкцій протезів на восковому базисі виявили, що міжзубний контакт спостерігається тільки в бокових ділянках. У фронтальній ділянці – сагітальна щилина шириною 1 см. Яка помилка, на Ваш погляд, допущена під час попередніх клінічних етапів?

- **A** Визначили та зафіксували передню оклюзію.
- **B** Отримали неточні анатомічні відбитки
- **C** Невірно визначили міжальвеолярну висоту
- **D** Визначили та зафіксували бокову оклюзію
- **E** Деформували восковий базис

Хворому М. вперше виготовляються повні знімні протези. Хворий з'явився на клінічний етап "накладання протезів". Серед рекомендацій лікар зазначає термін користування протезами. Визначте, коли слід виготовити нові протези даному хворому.

- А Через 3 роки
- В Через 2 роки
- С Через рік
- Д Через півроку
- Е Через 5 років

Хворому М. вперше виготовляються повні знімні протези. Хворий з'явився на клінічний етап "накладання протезів". Серед рекомендацій лікар зазначає термін користування протезами. Визначте, коли слід виготовити нові протези даному хворому.

A Через 3 роки

B Через 2 роки

C Через рік

D Через півроку

E Через 5 років

Термін служби повних знімних протезів:

Повні знімні протези, як правило, потребують заміни через 3-5 років.

Це пов'язано з тим, що з часом відбувається атрофія кісткової тканини щелеп, що призводить до зміни прилягання протеза.

Також з часом пластмаса з якої виготовлено протез, втрачає свої властивості.

Рекомендації лікаря:

Лікар, який вперше виготовляє повні знімні протези, повинен повідомити пацієнта про необхідність їх заміни через певний час.

Термін 3 роки є найбільш оптимальним, так як дозволяє уникнути значних змін в приляганні протеза.