

Показання та клініко-
лабораторні етапи
виготовлення вкладок: inlay,
onlay, overlay, pinlay.

Хворому 28 років виготовляється вкладка на 24 зуб
непрямим методом. Сформована порожнина для вкладки.
Який етап протезування має бути наступним?

- A** *Отримання відбитка
- B** Моделювання вкладки
- C** Виготовлення моделі
- D** Відливка вкладки
- E** Фіксація вкладки

Після того, як сформована порожнина для вкладки, наступним етапом протезування є отримання відбитка. Це потрібно для того, щоб точно відтворити форму підготовленої порожнини та виготовити модель, на основі якої буде виготовлена вкладка.

Дівчинка 12-ти років звернулась зі скаргами на дефект коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: зуб неодноразово був пломбований, але пломби випадали. Об'єктивно: 12 запломбований. Дефект IV класу за Блекум. Девіталізація не проводилась, перкусія 12 безболісна. Яку ортопедичну конструкцію доцільно використати в даному випадку?

Дівчинка 12-ти років звернулась зі скаргами на дефект коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: зуб неодноразово був пломбований, але пломби випадали. Об'єктивно: 12 запломбований. Дефект IV класу за Блекум. Девіталізація не проводилась, перкусія 12 безболісна. Яку ортопедичну конструкцію доцільно використати в даному випадку?

- **A *Вкладка на парапальпарних штифтах**
- **B** Металокерамічна коронка
- **C** Напівкоронка
- **D** Фарфорова коронка
- **E** Металева коронка

Чоловік, 26 років, скаржиться на часте випадіння пломби в зубі на нижній щелепі зліва. Об'єктивно: в 26 на жувально – апроксимальній поверхні дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорі не змінений перкусія безболісна, реакція на холод позитивна, швидко проходить після усунення дії подразника. Яка конструкція протеза показана?

Чоловік, 26 років, скаржиться на часте випадіння пломби в зубі на нижній щелепі зліва. Об'єктивно: в 26 на жувально – апроксимальній поверхні дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорі не змінений перкусія безболісна, реакція на холод позитивна, швидко проходить після усунення дії подразника. Яка конструкція протеза показана?

- **A *Вкладка.**
- **B** Напівкоронка.
- **C** 3/4 коронка.
- **D** Пластмасова коронка.
- **E** Металокерамічна коронка.

У хворого Р., 43 років , виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба. Корінь виступає над рівнем ясен на 0.5-1 мм. по периметру. Апікальна частина заплomboвана. З анамнезу відомо, що коронкова частина 13 зуба відламалась 3 тижні тому. До того зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту. Перкусія не болюча. Краї кореня – тверді.слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога.Ваші дії при даній патології.

У хворого Р., 43 років , виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба. Корінь виступає над рівнем ясен на 0.5-1 мм. по периметру. Апікальна частина запломбована. З анамнезу відомо, що коронкова частина 13 зуба відламалась 3 тижні тому. До того зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту. Перкусія не болюча. Краї кореня – тверді.слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога.Ваші дії при даній патології.

- **А** Виготовити кронково-кореневу вкладку і металокерамічну коронку
- **В** Видалити корінь зуба
- **С** Виготовити простий штифтовий зуб
- **Д** Відреставрувати зуб за допомогою анкера та фотополімерного матеріалу
- **Е** Виготовити штифтовий зуб за Річмондом