

Полтавський державний медичний університет

Кафедра дитячої стоматології



**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»**
СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ

АТРАВМАТИЧНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ГІПОПЛАЗІЇ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ. ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

Доповідачі: Поліщук Т.В., Шешукова О.В., Мосієнко А.С.

23-24 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ
ПОЛТАВА

АКТУАЛЬНІСТЬ

Гіпоплазія емалі одне із поширених уражень зубів некаріозного походження

Гіпоплазія - це некаріозне ураження зубів, вада розвитку емалі, що характеризується недостатнім фторуванням та мінералізацією

На сьогоднішній день частота виникнення постійно збільшується і сягає до 40%



МЕТА

Ознайомити стоматологів із
одним із методів лікування
гіпоплазії постійних зубів у
дітей



МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ДІЇ СТОМАТОЛОГА ПРИ ЗВЕРНЕННІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ ГІПОПЛАЗІЄЮ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ

1. Клінічні та лабораторні методи обстеження хворого
2. Надання кваліфікованої медичної допомоги
3. Чітке оформлення медичної документації, реєстрація даних анамнезу та обстеження, характеру проведених лікувальних заходів

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ХВОРОГО

Необхідно з'ясувати, чи не часто хворіла дитина на першому році життя чи були травми молочних зубів

Батьки хлопчика 9 років мали скарги на косметичний дефект зуба у фронтальній ділянці на верхній щелепі у вигляді борозни та незначний біль від термічних подразників

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ДІАГНОСТИКА ГІПОПЛАЗІЇ ЗУБІВ

1. Збір анамнезу

2. Клінічні методи дослідження: огляд, пальпація, перкусія, термодіагностика, контроль оклюзії

3. Додаткові методи дослідження: електроодонтодіагностика, рентгенологічне дослідження (за потребою)



МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ДІАГНОСТИКА ТРАВМИ ЗУБІВ

Із анамнезу дитина народжена передчасно із двояйцевої двійні.

Травму тимчасового зуба батьки заперечують. Зі слів матері, тимчасовий зуб неодноразово лікований.

Після прорізування постійного зуба батьки відмітили косметичний дефект верхнього правого центрального різця, а дитина мала скарги на неприємні відчуття від термічних та хімічних подразників.



МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

При огляді визначили:

- центральні різці прорізані на 4/5 довжини коронки
 - вестибулярна поверхня центрального правого різця має одиночну борозну в межах емалево-дентиноївої межі
 - емаль та дентин під час зондування щільні, гладкі, блискучі
- зондування та термодіагностика борозни викликає неприємні відчуття
 - перкусія безболісна
 - ясна в ділянці даного зуба в нормі



РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За проведеним дослідженням поставили діагноз відповідно за класифікацією гіоплазії постійних зубів у дітей

**МІСЦЕВА ГІПОПЛАЗІЯ ЕМАЛІ БОРОЗЧАТА ФОРМА 11
ЗУБА**

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

ЛІКУВАННЯ

- кінетичне легко-абразивне препарування твердих тканин у зоні ураження
- проведення антисептичної обробки поверхні
- проведення протравлення твердих тканин зуба перед пломбуванням
- проведення реставрації ділянки дефекта фотоматеріалом



ВИСНОВОК

Використання даного методу лікування не викликає сильних больових відчуттів і стресових ситуацій, що дуже важливо при лікуванні зубів дітям, а також завдає найменшої шкоди здоровим тканинам зуба

