

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Баб'ячок А.І., Федун І.Р., Ільчишин М.П.

ДНП «ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО»



Актуальність

НА СЬОГОДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА ДОМІНУЮТЬ СЕРЕД СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ І ТРАПЛЯЮТЬСЯ В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ, МОЖУТЬ МАТИ АГРЕСИВНИЙ ПЕРЕБІГ ІЗ ВИСОКОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО ПЕРІОДИЧНИХ ЗАГОСТРЕНЬ ТА РЕЦИДИВІВ. ЦЕ ВИКЛИКАЄ НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ РОЗРОБКИ ТА УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ТА СХЕМ МІСЦЕВОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ОСОБЛИВО ВАРТО ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА МЕДИКАМЕНТАХ ІЗ НЕСТЕРОЇДНОЮ ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ДІЄЮ, СЕРЕД ЯКИХ ВИРІЗНЯЄТЬСЯ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ БЕНЗИДАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ.




Мета дослідження – встановити ефективність запропонованої схеми терапії захворювань пародонта в осіб молодого віку.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 53 особи молодого віку хворі на хронічний катаральний гінгівіт та генералізований пародонтит початкового – I ступенів розвитку. Залежно від застосованих схем лікування, обстежуваних осіб поділили на дві групи. Усім хворим групи порівняння проводили лікування, передбачене Протоколом надання медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія». Хворим основної групи, окрім базової терапії, застосовували запропоновану схему лікування, яка включала використання розчину для полоскання «Фортеза» та таблетки «Хлорофіліпт». Обстеження проводили до лікування, відразу після лікування та через 6 місяців після лікування. Визначали індекс гігієни Гріна – Вермільйона (ОHI-S, 1964), індекс гінгівіту (РМА, Parma, 1960) та індекс кровоточивості (РВІ, 1977).




Результати та їх обговорення

Гігієна порожнини рота у хворих із патологією пародонта основної групи одразу після проведеного лікування суттєво покращилась і залишалась доброю упродовж півроку. В осіб із ХКГ та ГП початкового – I ступеня, до лікування яких входила запропонована схема, було виявлено кращий терапевтичний ефект як одразу після лікування, так і через 6 місяців після лікування, ніж у групі порівняння, про що засвідчили показники індексів РМА та РВІ.

Динаміка показників клінічних індексів у хворих на хронічний катаральний гінгівіт у різні терміни лікування (M±m)



Динаміка показників клінічних індексів у хворих на ГП поч. – І ст. у різні терміни лікування ($M \pm m$)



ВИСНОВКИ

Дані клінічних досліджень засвідчили суттєво кращі результати лікування захворювань пародонта у молодих осіб, при використанні розчину для полоскання «Фортеза» та таблеток «Хлорофіліпт», окрім базової терапії. Ефективність розробленої та застосованої схеми лікування підтверджується не тільки зникненням клінічних симптомів захворювання, а й тривалим стабільним лікувальним ефектом (упродовж півроку) як у хворих на хронічний катаральний гінгівіт, так і у хворих на генералізований пародонтит початкового – I ступеня розвитку захворювання.