

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НА ЗВИКАННЯ ДО ЧАСТКОВОГО ЗНІМНОГО ПЛАСТИНКОВОГО ПРОТЕЗА

Зубченко С.Г., Пивовар Ю.А., Зубченко Ю.П.
Полтавський державний медичний університет

Актуальність теми полягає у важливості розуміння того, як різні способи фіксації впливають на комфорт, стабільність та швидкість адаптації пацієнта до нового протезу, що є основним для успішного завершення лікування та покращення якості життя.

Актуальність дослідження: *Відсутність стандартних рішень:* Існує потреба в кращому розумінні впливу саме засобів фіксації на адаптацію при дефектах І класу за Кеннеді (двобічні кінцеві дефекти), які створюють певні складнощі для стабільності протеза.

Зменшення дискомфорту: Засоби фіксації можуть значно полегшити період звикання, зменшуючи больові відчуття, натерання тканин та нестабільність протеза, що є поширеними проблемами на початковому етапі.

Покращення функціональності: Надійна фіксація протеза забезпечує його стабільність під час жування та мовлення, що покращує функціональність протеза та загальний комфорт пацієнта.

Психологічний аспект: Успішне звикання до протеза, яке може бути забезпечене правильним вибором засобів фіксації, позитивно впливає на психоемоційний стан пацієнта.

Практичне значення для стоматологів: Дослідження дає лікарям-стоматологам цінну інформацію для обрання оптимальних засобів фіксації, що сприятиме підвищенню ефективності протезування та задоволеності пацієнтів.

Естетичний фактор: Деякі засоби фіксації, особливо в конструкціях з нейлону, можуть бути менш помітними, що покращує естетичний вигляд, особливо при дефектах на верхній щелепі.

Матеріали та методи: проведено клінічних обстежень та лікування 40 осіб, яким вперше виготовляють частковий знімний пластинкоюй протез, із дефектами зубного ряду I клас за Кеннеді на верхній щелепі та наявності лише у фронтальній ділянці зубів віком від 50 до 72 років та 10 осіб для контрольної групи із інтактним зубним рядом на верхній щелепі віком від 40 до 55 років

Пацієнтів поділили на 3 групи:

1 група – контрольна (наявні інтактні зуби на верхній щелепі) – 10 осіб

2 група – із застосуванням засобів для фіксації зубних протезів «КОРЕГА» Екстрабільний нейтральний смак – 20 особи

3 група – без застосування засобів для фіксації зубних протезів – 20 особи

Час звикання до часткового знімного пластинкового протеза індивідуальний, але зазвичай становить від кількох днів до одного місяця, а повна адаптація може зайняти до 2-3 місяців.

Дискомфорт, порушення мови та відчуття стороннього тіла поступово зникають, коли слизова оболонка ротової порожнини пристосовується до конструкції, а також налагоджуються функції жування та мовлення.

Результати та їх обговорення:

2 група: 17 осіб застосовували на постійній основі засіб для фіксації зубних протезів – час звикання у даних пацієнтів до 5 днів і

3 особи застосовували лише у день – час звикання у даних пацієнтів до 10 днів

3 група: 20 осіб не застосовували засіб для фіксації зубних протезів – час звикання у даних пацієнтів від 13 днів до 2 місяців

Висновок:

Дослідження впливу засобів фіксації «КОРЕГА» Екстрасильний нейтральний смак на звикання до протеза з дефектом І класу за Кеннеді є актуальним, оскільки це дозволить значно покращити результати протезування, зменшити дискомфорт для пацієнтів та підвищити успішність адаптації до нових протезів. А особливе значення має психологічний аспект завдяки якому успішне звикання до протеза та позитивно впливає на психоемоційний стан пацієнта.