

Поширеність пульпіту тимчасових зубів у дітей в усьому світі

Л.Ф.Каськова, Н.А.Моргун,
О.Ю.Андріянова

Полтавський державний медичний університет

- **Актуальність.** З огляду на те, що більшість захворювань ротової порожнини можна попередити, поширеність карієсу та його ускладнень залишаються важливою проблемою системи охорони здоров'я.
- **Мета** дослідження: проаналізувати джерела літератури щодо поширеності пульпіту тимчасових зубів у дітей в усьому світі.





- За даними МОЗ України у 2014-2015 роках питома вага ускладненого карієсу до усіх пролікованих зубів з приводу карієсу склала 30,4-31,9 % відповідно, що свідчить про дуже високий рівень стоматологічної захворюваності населення.
- Опрацювання 1025 медичних карт обстежених пацієнтів Закарпатської області за 2018-2020 роки показав, що ускладнений карієс серед дітей 5-6 років з тимчасовим прикусом реєструвався у 200 хлопчаків, що становить 42,1% та у 198 дівчат – 36%. У період змінного прикусу ускладнений карієс був виявлений у 181 хлопчика (38,1%) та у 176 дівчинки (32%).

- За даними польських авторів стоматологічне обстеження молочних зубів у дітей дошкільного віку проводилось надто мало, а профілактичне лікування – надто рідко. Згідно з опитуваннями, понад 60% матерів 3-річних дітей ніколи не водили своїх дітей до стоматолога, 56,3% матерів не цікавляться здоров'ям зубів своїх дітей, а 74% раз на рік водять своїх дітей на консультацію до педіатра.
- В Англії у 2021-2022 роках 63% видалень зубів у дітей віком від 0 до 19 років, які відвідували лікарні, були спричинені карієсом і частота видалень була в 3,5 рази вищою серед дітей, які живуть у найбільш бідних районах. Для оцінки стану зубів шведських дітей та підлітків були застосовані індекси карієсу відповідно до системи DMFT (зруйнований, відсутній, пломбований зуб).





- У Швеції компонент М не згадується в офіційних документах, оскільки дуже мало зубів втрачено через карієс. Сприяючим фактором може бути те, що стоматологічна допомога була безкоштовною для всіх дітей і молодих людей у Швеції вже понад півстоліття, що робить регулярні стоматологічні огляди рутиною, незалежно від відвідування державних стоматологічних клінік, або приватної стоматологічної клініки. У школах проводяться профілактичні програми.

- Аналіз потреб у амбулаторному лікуванні в державній стоматологічній лікарні в Китаї показав, що у 32,2% дітей було діагностовано захворювання пульпи. Було виявлено, що діти корінного населення Австралії, які не користувалися стоматологічними послугами за потреби, показали більшу поширеність видалення зубів через карієс порівняно з тими, хто звертався за потребою до стоматологічних послуг (12,7% і 5,9 відповідно).
-
- **Висновок.** Можемо зробити висновок, що здоров'я порожнини рота дітей дошкільного віку часто є нехтованим аспектом загального здоров'я дітей. Щоб знизити ризик розвитку карієсу та його ускладнень, необхідно діяти в більшій кількості сфер, починаючи з навчання батьків, дітей та персоналу дошкільних закладів, що потребує планування та впровадження профілактичних стоматологічних програм



○ Дякуємо за увагу!

